


ANIERCIL VITAMINADO

Reg. Sagar Q-1069-027

Solución acuosa inyectable

LABORATORIOS
TORNEL, S.A.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Metilarseniato sódico	9.3900 g.
Metilarseniato férrico	0.1899 g.
Metilarseniato cúprico	0.0317 g.
Metilarseniato de estricnina	0.1206 g.
Vitamina B12	1.00 g.
Cloruro de sodio	1.9618 g.
Agua inyectable, c.b.p.	100 ml.



PRESENTACIÓN

Cajas con 5 ampollitas de 10 ml c/u.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda

ESPECIES

Bovinos, ovinos, equinos, porcinos, perros y gatos

DOSIS

Bovinos y equinos:	10 ml.
Ovinos y porcinos:	2 a 5ml.
Cánidos y félicos:	0.5 ml.

PROPIEDADES

- Aniercil Vitaminado es una solución inyectable, que se puede usar como tónico reconstituyente, ya que está formulado a base de arsenicales de gran tolerancia, por lo que actúa como poderoso estimulante metabólico
- Recomendado para el tratamiento de anemia, debilidad, estimulante del apetito, ayuda a la tersura de la piel
- Excelente producto para preparar animales que participaran en ferias y exposiciones.
- Úselo después de haber sufrido enfermedades como diarreas, retención placentaria, piroplasmosis, anaplasmosis.
- Estimula el crecimiento de los animales jóvenes, favorece a la formación del callo óseo en animales fracturados y a la recuperación de las lesiones del ojo (córnea).
- **Aniercil Vitaminado** está enriquecido con vitamina B₁₂, la vitamina contra las anemias. Esta adición potencia la actividad del ANIERCIL cuya actividad primera es como un estimulante metabólico.

RECOMENDACIONES

- Aplique la inyección cada tercer día durante cinco veces, y repítase cuantas veces sea necesario hasta observar mejoría
- La aplicación de una serie de 10 a 20 inyecciones (1 cada tercer día) proporciona notable mejoría del estado general, restablece el apetito y la aptitud para el trabajo, hace desaparecer la tristeza y el decaimiento, y facilita el aumento de peso.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. Al aplicar utilice material totalmente estéril. No se administre el producto después de la fecha de caducidad. Úsese como se indica y/o bajo vigilancia del médico veterinario. Este medicamento deberá administrarse vía intramuscular. No se deje al alcance de los niños. Conserve en lugar fresco y seco, alejado de la luz.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA.