



**LABORATORIOS
TORNEL, S.A.**

CALCIO-TON

Reg. Sagar Q-1069-013

Calcificante y reconstituyente inyectable

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:
Borogluconato levulinato de calcio. 23.5 g.
D. Sacarato de calcio 0.6 g.
Glicerofosfato de calcio 1.8 g.
Dextrosa U.S.P. 20 g.
Cloruro de magnesio 0.75 g.
Agua bidestilada c.b.p. 100 ml.
0.5% de fenol como conservador.



PRESENTACION

Frascos ampula con 250 y 500 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral en avestruces y aves de ornato.
Endovenosa o intraperitoneal en el resto de las especies.

DOSIS

Equinos y bovinos: 250 a 500 ml.
Ovejas y porcinos: 25 a 100 ml.
Perros y zorras: 5 a 10 ml.
Avestruces mayores de 8 meses: 15 ml por litro de agua de bebida, por ave, cada 7 días.

PROPIEDADES

- La «fiebre de leche» o paresia puerperal es el desórden en el equilibrio de los minerales que aparece en la vaca y otras hembras después del parto, debido a las exigencias de la producción láctea, que reduce los niveles de calcio y magnesio en sangre
- Muchos de los signos se producen también por déficit de fósforo, presentándose la paresia post-parto. La baja de calcio (hipocalcemia) va acompañada de parálisis muscular, tanto de los músculos estriados como de los lisos
- **Calcio-ton** tiene los niveles adecuados de calcio, fósforo, magnesio y dextrosa, que estabilizan los niveles en la sangre, devolviendo las funciones normales al organismo
- Aplique **Calcio-Ton** para tratar «fiebre de leche», raquitismo, tetania de los pastos y osteomalasia
- **Calcio-Ton** es un eficiente auxiliar en la terapia rutinaria contra intoxicaciones o envenenamientos
- **Calcio-Ton** ayuda a resolver el problema de la «pica o malasia» causada por una baja considerable del fósforo en los pastos
- **Calcio-Ton** es de valiosa ayuda en el tratamiento de la eclampsia de lactación en las parturientas, así como en crisis convulsivas, paraplejías y otros estados que incluyen los causados por mordeduras de serpientes venenosas

RECOMENDACIONES

Calcio-Ton debe administrarse lentamente. Dé tiempo de recuperación a la enferma para evitar riesgos de caídas por el mareo. Consérvese en lugar fresco y seco. No se exponga a la luz. No se

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA